

Farmatan Liquid

Keeps Poultry Litter Dry

SYNERGISTIC MODE OF ACTION


Sweet chestnut Extract



Monobutyryn

Biological Activity of Farmatan Liquid on Broilers with Gastrointestinal Disorders

Commercial farm, Bulgaria, January 2014



Note: Above bar chart shows that mortality were decreased in trial Trial1(0.2%), Trial 2(1%), Trial 3(0.3%) & Trial 4(1.9%)



ফার্মাটেন লিকুইড

পোল্ট্রি লিটার শুষ্ককারক

Description :

Farmatan Liquid is a complementary feed, blend of a natural plant extracts with Ca-butyrate. To be used exclusively in the manufacture of animal feedstuffs.

Composition:

Each 100 ml contains-	
Sweet chestnut extracts (Castanea sativa)	15 ml
Calcium salt of butyric acid	20 ml
Essential oil	50 ml
Carrier q.s.to	100 ml

Indication:

- Keeps poultry litter dry.
- Reduces quantity of ammonia gas.
- Stimulates the growth of villi in the intestinal tract, resulting in a better digestion and nutrient absorption.
- Improves production parameters (example: daily weight gain, feed conversion ratio and laying rate.)
- Supports eubiosis, optimal balance of intestinal microflora e.g. coliforms, streptococci and lactobacilli.

Dosage and administration:

Broiler: 1 ml per 1-2 liter of drinking water 8 hourly for 7 consecutive days.

Layer: 1 ml per 1-3 liter of drinking water 8 hourly for 7 consecutive days.

Cattle: 25 ml per 100 kg body weight daily for 5-7 consecutive days.

Pack size: 100 ml & 500 ml

Storage:

Store in a cool and dry place. Protect from light. Keep out of the reach of children.

বর্ণনা:

ফার্মাটেন লিকুইড হচ্ছে পোল্ট্রির জন্য সম্পূরক খাদ্য উপাদান যা প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ নির্ধারিত এর সাথে ক্যালসিয়াম বিউটারেট এর একটি সুঘম মিশ্রণ।

উপাদান:

প্রতি ১০০ মিলি পাউডারে আছে:	
সুইট চেস্টনাট এক্সট্রাক্ট (কেস্টানিয়া সেটাইভা)	১৫ মিলি
বিউটারিক এসিড এর ক্যালসিয়াম সল্ট	২০ মিলি
এসেন্সিয়াল অয়েল	৫০ মিলি
কারিয়ার কিউ.এস. টু	১০০ মিলি

ফার্মাটেন লিকুইড এর উপকারিতা:

- পোল্ট্রি লিটার শুষ্ক রাখে
- অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণ কমায়
- খাদ্যনালীর ভিলাই এর বৃদ্ধিকে স্টিমুলেট করে যার ফলে হজম ভাল হয় ও পুষ্টি শোষণ বৃদ্ধি পায়
- উৎপাদনের মানদণ্ডকে উন্নত করে (যেমন: প্রতিদিনের ওজন বৃদ্ধি করে খাদ্য রূপান্তরের হার উন্নত করে এবং ডিমের উৎপাদন বাড়ায়)
- অল্পে বিভিন্ন অনুজীব যেমন-কলিফর্ম, স্ট্রেপ্টোকক্কাই এবং ল্যাকটোব্যাসিলি এর সমতা বজায় রাখে অর্থাৎ ইউব্যায়োসিসের সহায়তা করে

মাছ ও প্রয়োগবিধি:

ব্রয়লার: ১ মিলি প্রতি ১-২ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা পরপর ৭ দিন।

লেয়ার: ১ মিলি প্রতি ১-৩ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা পরপর ৭ দিন।

গবাদি প্রাণি: প্রতিদিন ২৫ মিলি প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য পরপর ৫-৭ দিন।

প্যাক সাইজ: ১০০ মিলি এবং ৫০০ মিলি।

সংরক্ষণ:

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।
শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

Manufactured by:



For Veterinary Use Only

Marketed by:



ACI Animal Health
245, Tejgaon Industrial Area
Dhaka-1208